

UN TRATTAMENTO DURA FINO A 90 GIORNI

Bayer
Garden



FORMICHE
Solfac® Gel



Una goccia/metro lineare



ESCA INSETTICIDA
IN GEL LIQUIDO

- Facile da usare
- Altamente attrattivo e appetibile per le formiche
- Attivo anche nel formicaio



SBM
Life science
www.bayergarden.it
1780214413E
aggr. 05/2016
Gruppo Bayer
Marchio registrato



4 g e

Da non vendersi sfuso.
destinate all'alimentazione.
Da non impiegare in agricoltura o su piante comunque
che possono derivare da un uso improprio del preparato.
Chi impiega il prodotto è responsabile per eventuali danni
disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.
mangiato, erogatori d'acqua. Scheda dati di sicurezza
a contatto. Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità
in modo da evitare che persone e animali possano venire
indumenti protettivi e guanti adatti. Posizionare il prodotto
immediatamente e abbondantemente con acqua. Usare
ben chiuso. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle, lavare
in caso di contatto con gli occhi e la pelle, lavare
erogatori. Conservare al riparo dal gelo. Tenere il recipiente
gli erogatori vuoti. Non cercare in alcun modo di aprire gli
rimosso dalla superficie trattata con una spugna imbevuta
destinati a contenerne. Non contaminare superfici che possono
venire in contatto con alimenti. Terminata la disinfestazione
rimuovere il gel residuo dai punti esca. Il gel può essere
Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti
immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.
Dopo l'applicazione o in caso di contatto con la pelle lavarsi
Avertenze

Informazioni per il medico
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consue
interventi di pronto soccorso. Terapia sintomatica. Consulta
re un Centro Antivele.

accidentale del prodotto da parte di persone.
Solfac® Gel Formiche contiene BTRFX, sostanza
e ripristinarlo quando esaurito.
Contrattare regolarmente la presenza di Solfac Gel Formiche
Un trattamento dura fino a 90 giorni.
* Una goccia è pari a circa 0,2 g
equivalente a 10 gocce)
Trattamento formiche: massimo 2 g all'ingresso del nido (che
Rimuovere il tappo dal tubetto e dosare a gocce:
Trattamento formiche: massimo 2 g all'ingresso del nido (che

DOSE D'IMPIEGO

Solfac Gel Formiche.
ecc...) e non applicare altri insetticidi sulle zone trattate con
recentemente con insetticidi tradizionali (spray, polvere,
Non applicare Solfac Gel Formiche in zone trattate
successive 24 ore al trattamento ritrattare.
soggette a lavaggi frequenti e in caso di piogge nelle
Solfac Gel Formiche non deve essere collocato in aree
sotto i lavelli, dietro i frigoriferi, all'interno di condotti, etc...
trasfanno le formiche (dietro mobili, scaffali, sotto i fornel
pavimento, nelle zone nascoste e in generale nei luoghi dove
Applicare le gocce direttamente nelle fessure dei muri o del
Solfac Gel Formiche si usa in gocce.

MODALITÀ D'IMPIEGO

portici, marciapiedi e garage.
d'attesa, cantine e in aree esterne come balconi, terrazzi,
soggiorno, camera da letto, ma anche ristoranti, uffici, sale
la presenza di formiche in ambienti interni come cucina,
Solfac® Gel Formiche si applica ovunque venga rilevata

CAMPI D'IMPIEGO

- Impiegabile per trattamenti in aree interne ed esterne.
- Altamente attrattivo e appetibile per le formiche;
- Adatto e attivo anche nel formicaio;
Solfac® Gel Formiche è:
- Adatto e attivo anche nel formicaio;
- Altamente attrattivo e appetibile per le formiche;
- Impiegabile per trattamenti in aree interne ed esterne.

Solfac® Gel Formiche è una pratica esca insetticida in gel
liquido, facile da usare e specifica per il controllo delle
formiche fuori e dentro al formicaio (*M. pharaonis*, *L. niger*,
attratte dal gel, se ne cibano e lo trasportano anche nel nido.
Solfac® Gel Formiche è:
- Adatto e attivo anche nel formicaio;
- Altamente attrattivo e appetibile per le formiche;
- Impiegabile per trattamenti in aree interne ed esterne.

CONSIGLI DI PRUDENZA

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

INDICAZIONI DI PERICOLO

100 g di prodotto contengono:
imidacloprid 0,03 g
denatoniun benzato (Btix) 0,01 g
coformulanti q.b. a 100.

COMPOSIZIONE

Solfac® Gel Formiche
Pronto uso

SOLFAC® GEL FORMICHE
Insetticida in gel liquido per il controllo delle formiche

